



السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الزراعة
الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية



نشرة إرشادية عن الزعتر

الإعلام الزراعي
مارس/2010

أخرى المزارع

يعتبر محصول الزعتر فى فلسطين من المحاصيل الشعبية والتي تلقى رواجاً لدى المواطن الفلسطيني .
وزراعة الزعتر تدر دخلاً جيداً على المزارع خاصة فى ظل الظروف الحالية ، والزعتر نبات عشبي معمر
يمكن فى الأرض عدة سنوات ويمكن زراعته زراعة عضوية وهى الأفضل .
ويدخل الزعتر فى الصناعات الطبية والعطرية والفطائر .
ويمكن زراعة الزعتر بالبذرة (فى المشتل) أو بالعقل أو بتفسيخ النباتات المزروعة بالأرض المستديمة .

1. تحضير الأرض:

تحرث الارض بمحراث سكين بعمق 35سم ثم تضاف الاسمدة العضوية والكيماوية الأساسية
بعد ذلك تروى الأرض بالماء بمعدل 50كوب/دونم لاتاحة الفرصة للاعشاب للنمو .
ثم تحرث الأرض بالفرامة بعد عدة أيام. و يعاد ربيها بالماء بمعدل 30كوب/دونم
وتفرم بالفرامة مرة أخرى لتنعيم التربة .
ينصح باستخدام سماد الكومبوست قبل الزراعة بدلاً من السماد العضوى بمعدل 2كوب/دونم .
أما بالنسبة لعملية التعقيم فينصح باتباع التعقيم الحراري (الشمسى) من منتصف شهر يونيو وحتى منتصف
أغسطس .

فوائد ومميزات التعقيم الحراري:

- زيادة نمو النباتات.
- تحسين جودة الثمار.
- زيادة الإنتاج.
- مقاومة العديد من الفطريات والنيماتودا والتخلص من معظم بذور الأعشاب.
- مدة فعالية التعقيم 2-3 عروات و تكتسب التربة صفة مقاومة الأمراض.
- قليلة التكاليف مقارنة بطرق التعقيم الكيماوي .
- يحافظ على البيئة من التلوث.

2. **مواعيد الزراعة** : يمكن زراعة الزعتر من بداية أكتوبر وحتى شهر مارس.

3. طرق الزراعة والمسافات :

يزرع الزعتر على مصاطب بعرض 180سم ويزرع على المصطبة من 3-4 شجور أو تتم الزراعة في خطوط المسافة بينها 50سم والبعد بين الشتلات 25سم.

4. الري :

يتم ري الأشتال رية غزيرة بعد الزراعة ثم ننتظم بالري حسب درجة حرارة الجو ويجب أن يكون الري خفيف وعلى فترات متقاربة نظراً لأن جذر الزعتر لا يتعمق في التربة .
وعند سقوط الأمطار نتوقف عن الري حتى شهر إبريل حيث يكون الري بعد ذلك على فترات متقاربة.

5. التسميد الرأسي :

ينصح بالتسميد بسماذ اليوريا بمعدل 2كجم/دونم أسبوعياً أو سماذ الأمونيأك بمعدل 4 كجم أسبوعياً .

6. العناية بالحصول :

أ- عند بلوغ عمر النبات 3 أسابيع ينصح بقص القمة النامية للشتلة وذلك بإزالة الثلث العلوي للشتلة حتى نشجع ظهور النموات الجانبية والتخلص من السيادة القمية .
ب- يجب التخلص من الأعشاب إما بالعزيق أو التعشيب باليد حتى لا توفر بيئة صالحة للآفات والأمراض.

7. القطف :

يتم القطف في الزعتر عدة قطفات تبدأ القطفة الأولى في شهر مارس من الأشتال التي زرعت في شهر أكتوبر ثم تستمر عملية القطف كل شهرين .
عند القطف يجب أن يتم القطف على إرتفاع 10سم من فوق سطح التربة ويجب أن نترك من 2-3 أفرع على النبات للمحافظة على التوازن ما بين النمو الخضري والجذري .
وعموماً يكون إنتاج الشتاء أكبر من إنتاج الصيف ويعطى دونم الزعتر حوالي 1.5-2 طن محصول اخضر أي حوالي 300-350 كجم محصول جاف .

8. الأمراض والحشرات :

1. مرض الصدأ.

2. البياض الزغبي.

3. اللفحة المبكرة.

4. الذبول.

5. 5- الديدان القارضة.

6. 6- ذبابة الانفاق.

و عند الإصابة بإحد الامراض السابقة ينصح بمراجعة مرشد المنطقة لوصف العلاج المناسب.

9. كيفية تجفيف الزعتر :

1. التجفيف الطبيعي :

يتم فى مكان مظلل جيد التهوية ويجب ألا يزيد سمك الطبقة عن 10سم مع التقليب المستمر. مع البعد عن الندى (الرطوبة) لأنها تسبب اسوداد الأوراق وتغير الطعم.

2. التجفيف الصناعى :

وهو الأفضل للمحافظة على نسبة الزيت واللون بالإضافة إلى عدم التلوث.

الجزء المستعمل من الزعتر: الفروع المزهرة، والأوراق.

وله فوائد طبية كثيرة منها:

1. علاج الكحة والسعال الديكي.
2. يمكن غليه واستعماله كمضمضة لعلاج اللثة بالفم أو غرغرة لالتهاب الحلق.
3. ويقضى على الطفيليات المعوية.
4. يستعمل كمسحوق فى غيار الجروح المتقيحة.
5. يقلل التقلصات ويفيد فى بداية نزلات البرد والصداع.
6. يمنع الغازات المعوية والشد العضلي.
7. يستخدم كفاتح للشهية ومنبه للذاكرة.

المحافظات الجنوبية - غزة

www.moa.gov.ps

حقوق الطبع محفوظة - وزارة الزراعة - غزة